

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

«Γραμμική Άλγεβρα & Αναλυτική Γεωμετρία» (EM111) – Χειμερινό Εξάμηνο 2008-2009
Διδάσκων: Ι. Τσαγράκης

11^ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Άσκηση 1: Δείξτε ότι η ορίζουσα ενός πίνακα $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ ισούται με το γινόμενο των ιδιοτιμών του.

Άσκηση 2: Να αποδειχθούν οι επόμενες προτάσεις:

- α) Οι πίνακες A, A^T έχουν τις ίδιες ιδιοτιμές, για κάθε πίνακα $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$.
- β) Αν $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{F}$ είναι οι ιδιοτιμές ενός πίνακα $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, τότε $a\lambda_1, a\lambda_2, \dots, a\lambda_n$ είναι οι ιδιοτιμές του aA , όπου a είναι τυχαίος αριθμός. Επίσης, για $a \neq 0$ ισχύει ότι $V_{\lambda_i}(A) = V_{a\lambda_i}(aA)$, $\forall \lambda_i$ με $i=1, 2, \dots, n$.
- γ) Αν $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{F}$ είναι οι ιδιοτιμές ενός μη-ιδιόμορφου πίνακα $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, τότε $\frac{1}{\lambda_1}, \frac{1}{\lambda_2}, \dots, \frac{1}{\lambda_n}$ είναι οι ιδιοτιμές του A^{-1} , και $V_{\lambda_i}(A) = V_{1/\lambda_i}(A^{-1})$, $\forall \lambda_i$ με $i=1, 2, \dots, n$.
- δ) Οι ιδιοτιμές ενός τριγωνικού πίνακα είναι τα στοιχεία της κύριας διαγωνίου του.

Άσκηση 3: Έστω ένας πίνακας $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ και $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \in \mathbb{F}$ είναι ιδιοτιμές του A όλες διαφορετικές μεταξύ τους. Δείξτε ότι το άθροισμα των ιδιοχώρων $V_{\lambda_1}(A) + V_{\lambda_2}(A) + \dots + V_{\lambda_k}(A)$ είναι ευθύ. Δηλαδή, $V_{\lambda_1}(A) + V_{\lambda_2}(A) + \dots + V_{\lambda_k}(A) = V_{\lambda_1}(A) \oplus V_{\lambda_2}(A) \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}(A)$.

Άσκηση 4: Έστω δυο όμοιοι πίνακες $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$, δηλαδή υπάρχει αντιστρέψιμος πίνακας $P \in \mathbb{F}^{n \times n}$ τέτοιος ώστε $B = P^{-1}AP$. Δείξτε ότι: α) $\det A = \det B$, β) $B^k = P^{-1}A^kP$ με $k \in \mathbb{N}$, γ) $X_A(\lambda) = X_B(\lambda)$.

Άσκηση 5: Έστω ένας πίνακας $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$. Δείξτε ότι τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα.

- α) ο A είναι διαγωνιοποιήσιμος.
- β) ο A έχει n γραμμικώς ανεξάρτητα ιδιοδιανύσματα (δηλ. υπάρχει βάση του \mathbb{F}^n που να αποτελείται από ιδιοδιανύσματα του A).
- γ) Αν $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \in \mathbb{F}$ είναι όλες οι διαφορετικές ιδιοτιμές του A , τότε $V_{\lambda_1}(A) \oplus V_{\lambda_2}(A) \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}(A) = \mathbb{F}^n$.

Άσκηση 6: Δείξτε ότι αν ένας πίνακας $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ έχει n διαφορετικές ιδιοτιμές, τότε διαγωνιοποιείται στο \mathbb{F} . Αν $\lambda \in \mathbb{F}$ μια ιδιοτιμή του ενός τέτοιου πίνακα A , ποια είναι η $\dim V_{\lambda}(A)$;

Άσκηση 7: Δίνεται ο πίνακας $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$.

- α) Βρείτε το χαρακτηριστικό πολυώνυμο και τις ιδιοτιμές του A .
- β) Βρείτε από μια βάση για κάθε ιδιόχωρο του A .
- γ) Δείξτε ότι ο A είναι διαγωνιοποιήσιμος στο \mathbb{R} .
- δ) Βρείτε πίνακα που να διαγωνιοποιεί τον A , καθώς και το διαγώνιο πίνακα που θα προκύψει.

Άσκηση 8: Έστω ένας πίνακας $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ με χαρακτηριστικό πολυώνυμο $X_A(\lambda) = -\lambda^3 + 5\lambda - 4$.

- α) Βρείτε το n .
- β) Εξηγήστε γιατί ο πίνακας είναι διαγωνιοποιήσιμος στο \mathbb{R} .
- γ) Αν $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ είναι αντιστρέψιμος πίνακας τέτοιος ώστε ο $B = P^{-1}AP$ να είναι διαγώνιος, να υπολογιστεί η $\det B$.

Άσκηση 9: Να διαγωνιοποιηθεί ο πίνακας $A = \begin{bmatrix} 5 & -4 \\ 6 & -6 \end{bmatrix}$ και να υπολογιστεί ο A^{100} .

Άσκηση 10: α) Αν A είναι ένας $n \times n$ πίνακας με τι ισούται το $X_A(0)$;

β) Αν το χαρακτηριστικό πολυώνυμο ενός πίνακα B είναι $X_B(\lambda) = -\lambda^3 + 15\lambda^2 - 25\lambda + 172$, να βρεθεί η ορίζουσα του.

Άσκηση 11: Δείξτε ότι αν ο A είναι διαγωνιοποιήσιμος $n \times n$ πίνακας, τότε οι A και A^T είναι όμοιοι πίνακες.

Άσκηση 12: Για τις ακόλουθες περιπτώσεις βρείτε το χαρακτηριστικό πολυώνυμο και τις ιδιοτιμές του A . Κατόπιν βρείτε από μια βάση για κάθε ιδιόχωρο του A και εξετάστε αν ο A είναι διαγωνιοποιήσιμος. Στην περίπτωση που ο A διαγωνιοποιείται, βρείτε πίνακα που να τον διαγωνιοποιεί και το διαγώνιο πίνακα που θα προκύψει.

$$\alpha) \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad \beta) \quad A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ΕΜ-111)

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 11ου ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 1

Αν $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ είναι οι ιδιοτιμές του A , τότε το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του A μπορεί να γραφεί ως:

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda) \dots (\lambda_n - \lambda)$$

Για $\lambda = 0$ έχουμε: $\chi_A(0) = \det(A) = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n$

ΑΣΚΗΣΗ 2

α) \forall ιδιοτιμή λ του A έχουμε:

$$\det(A - \lambda I) = 0 \Leftrightarrow \det[(A - \lambda I)^T] = 0 \Leftrightarrow \det(A^T - \lambda I) = 0$$

Επομένως: $\left. \begin{array}{l} \det(A - \lambda I) = 0 \\ \det(A^T - \lambda I) = 0 \end{array} \right\}$ ίδιες ρίζες, άρα A, A^T έχουν ίδιες ιδιοτιμές.

β) \forall ιδιοτιμή λ_i με αντίστοιχο ιδιοδιάνυσμα \vec{X}_i του A έχουμε:

$$A\vec{X}_i = \lambda_i \vec{X}_i \Leftrightarrow (\alpha A)\vec{X}_i = (\alpha \lambda_i)\vec{X}_i \quad \text{για } \alpha \neq 0$$

δηλ. το $(\alpha \lambda_i)$ είναι ιδιοτιμή του (αA) .

Άρα, \forall ιδιοτιμή λ_i του A , το $\alpha \lambda_i$ είναι ιδιοτιμή του αA και αντίστροφα, κάθε ιδιοτιμή μ_i του (αA) γράφεται ως $\mu_i = \alpha \lambda_i$.

Επίσης, κάθε ιδιοδιάνυσμα \vec{X}_i του A που αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή λ_i είναι επίσης, ιδιοδιάνυσμα του (αA) που αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή $\alpha \lambda_i$ και αντίστροφα. Δηλ. $\vec{X}_i \in V_{\lambda_i}(A) \Leftrightarrow \vec{X}_i \in V_{\alpha \lambda_i}(\alpha A), \forall i=1,2,\dots,n$

Άρα: $V_{\lambda_i}(A) = V_{\alpha \lambda_i}(\alpha A), \forall \lambda_i = \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$

Όταν $\alpha = 0$ έχουμε:

$$A\vec{X}_i = \lambda_i \vec{X}_i \Rightarrow 0A\vec{X}_i = 0\lambda_i \vec{X}_i \Rightarrow 0\vec{X}_i = 0\vec{X}_i$$

δηλ. $0\lambda_i$, \forall ιδιοτιμή λ_i του A , το $0\lambda_i = 0\lambda_i = 0$ είναι ιδιοτιμή

του $\alpha A = 0A = \mathbf{0}$, και αντίστροφως, κάθε ιδιοτιμή $\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_n = 0$ του

$\alpha A = \mathbf{0} \in \mathbb{F}^{n \times n}$ γράφεται ως $\mu_i = 0 = 0\lambda_i = \alpha\lambda_i$

Επίσης, κάθε ιδιοδιάνυσμα \vec{X}_i που αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή λ_i του A είναι και ιδιοδιάνυσμα του $\alpha A = \mathbf{0}$ που αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή $\alpha\lambda_i = 0$. Άρα $V_{\lambda_i}(A) \subseteq V_{0\lambda_i}(0A) = \mathbb{F}^n$

Το αντίστροφο όμως δεν ισχύει, δηλ. κάθε ιδιοδιάνυσμα \vec{X} του $\alpha A = \mathbf{0}$ (αρα κάθε διάνυσμα του \mathbb{F}^n) δεν είναι απαραίτητα και ιδιοδιάνυσμα του A , αφού, $(0A)\vec{X} = (0\lambda)\vec{X}$ δεν συνεπάγεται $A\vec{X} = \lambda\vec{X}$.

γ) \forall ιδιοτιμή λ_i του A με αντίστοιχο ιδιοδιάνυσμα \vec{X}_i , έχουμε:

$$A\vec{X}_i = \lambda_i\vec{X}_i \Leftrightarrow \underbrace{A^{-1}A}_{I_n}\vec{X}_i = \lambda_i A^{-1}\vec{X}_i \Leftrightarrow \vec{X}_i = \lambda_i A^{-1}\vec{X}_i \Leftrightarrow A^{-1}\vec{X}_i = \frac{1}{\lambda_i}\vec{X}_i$$

Άρα, \forall ιδιοτιμή λ_i του A , η $\frac{1}{\lambda_i}$ είναι ιδιοτιμή του A^{-1} , δηλ. οι

$\frac{1}{\lambda_1}, \frac{1}{\lambda_2}, \dots, \frac{1}{\lambda_n}$ είναι οι ιδιοτιμές του $A^{-1} \in \mathbb{F}^{n \times n}$. Επίσης, κάθε

ιδιοδιάνυσμα \vec{X}_i του A που αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή λ_i είναι και ιδιοδιάνυσμα του A^{-1} που αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή $1/\lambda_i$, και

αντίστροφως. Δηλαδή, $\vec{X}_i \in V_{\lambda_i}(A) \Leftrightarrow \vec{X}_i \in V_{1/\lambda_i}(A^{-1})$, $\forall i=1,2,\dots,n$

Άρα: $V_{\lambda_i}(A) = V_{1/\lambda_i}(A^{-1})$, $\forall \lambda_i = \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$

δ) Αν $A = [\alpha_{ij}] \in \mathbb{F}^{n \times n}$ είναι τριγωνικός, τότε και ο $(A - \lambda I)$ είναι τριγωνικός με στοιχεία στην κύρια διαγώνιο του τα $(\alpha_{11} - \lambda), (\alpha_{22} - \lambda), \dots, (\alpha_{nn} - \lambda)$. Επειδή η ορίζουσα ενός τριγωνικού πίνακα ισούται με το γινόμενο των στοιχείων της κύριας διαγώνιου του, θα έχουμε:

$$\det(A - \lambda I) = (\alpha_{11} - \lambda)(\alpha_{22} - \lambda) \cdots (\alpha_{nn} - \lambda)$$

$$\text{Επομένως: } \det(A - \lambda I) = 0 \Leftrightarrow (\alpha_{11} - \lambda)(\alpha_{22} - \lambda) \cdots (\alpha_{nn} - \lambda) = 0$$

η οποία έχει τις ρίζες:

$$\left. \begin{cases} \lambda_1 = \alpha_{11} \\ \lambda_2 = \alpha_{22} \\ \vdots \\ \lambda_n = \alpha_{nn} \end{cases} \right\} \text{δηλ. τα στοιχεία της κύριας διαγώνιου του τριγωνικού} \\ \text{πίνακα } A \text{ είναι οι ιδιοτιμές του.}$$

ΑΣΚΗΣΗ 3

Θα αποδείξουμε την πρόταση επαγωγικά.

Για $k=2$: Έστω $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{F}$ ιδιοτιμές του A με $\lambda_1 \neq \lambda_2$.

Αν $\vec{X} \in V_{\lambda_1}(A) \cap V_{\lambda_2}(A)$, τότε:

$$A\vec{X} = \lambda_1\vec{X} \quad \text{και} \quad A\vec{X} = \lambda_2\vec{X}$$

$$\text{Επομένως: } \lambda_1\vec{X} = \lambda_2\vec{X} \Rightarrow (\lambda_1 - \lambda_2)\vec{X} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \vec{X} = \vec{0} \quad \text{δ.λ.} \quad \vec{X} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{Άρα: } V_{\lambda_1}(A) \cap V_{\lambda_2}(A) = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow V_{\lambda_1}(A) + V_{\lambda_2}(A) = V_{\lambda_1}(A) \oplus V_{\lambda_2}(A)$$

Έστω ότι για οποιεσδήποτε k ιδιοτιμές του A διαφορετικές μεταξύ τους, το άθροισμα των ιδιοχώρων τους είναι ευθύ.

Έστω $k+1$ τυχαίες ιδιοτιμές του A διαφορετικές μεταξύ τους:

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k, \lambda_{k+1} \in \mathbb{F}$. Για να δείξουμε ότι

$$V_{\lambda_1}(A) + V_{\lambda_2}(A) + \dots + V_{\lambda_k}(A) + V_{\lambda_{k+1}}(A) = V_{\lambda_1}(A) \oplus V_{\lambda_2}(A) \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}(A) \oplus V_{\lambda_{k+1}}(A)$$

αρκεί να δείξουμε ότι οποιαδήποτε ιδιοδιανύσματα $\vec{X}_1, \vec{X}_2, \dots, \vec{X}_k, \vec{X}_{k+1}$ με $\vec{X}_1 \in V_{\lambda_1}(A)$, $\vec{X}_2 \in V_{\lambda_2}(A)$, \dots , $\vec{X}_k \in V_{\lambda_k}(A)$, $\vec{X}_{k+1} \in V_{\lambda_{k+1}}(A)$ είναι γραμμικώς ανεξάρτητα.

$$\text{Έστω } \mu_1\vec{X}_1 + \mu_2\vec{X}_2 + \dots + \mu_k\vec{X}_k + \mu_{k+1}\vec{X}_{k+1} = \vec{0} \quad (1)$$

όπου $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k, \mu_{k+1} \in \mathbb{F}$

Πολλαπλασιάζοντας και τα δύο μέλη της εξίσωσης (1) με την ιδιοτιμή λ_{k+1} προκύπτει:

$$(\lambda_{k+1}\mu_1)\vec{X}_1 + (\lambda_{k+1}\mu_2)\vec{X}_2 + \dots + (\lambda_{k+1}\mu_k)\vec{X}_k + (\lambda_{k+1}\mu_{k+1})\vec{X}_{k+1} = \vec{0} \quad (2)$$

Επίσης, πολλαπλασιάζοντας από αριστερά με A και τα δύο μέλη της (1) προκύπτει:

$$\begin{aligned} \mu_1 A \vec{X}_1 + \mu_2 A \vec{X}_2 + \dots + \mu_k A \vec{X}_k + \mu_{k+1} A \vec{X}_{k+1} &= \vec{0} \Rightarrow \\ \Rightarrow \mu_1 \lambda_1 \vec{X}_1 + \mu_2 \lambda_2 \vec{X}_2 + \dots + \mu_k \lambda_k \vec{X}_k + \mu_{k+1} \lambda_{k+1} \vec{X}_{k+1} &= \vec{0} \end{aligned} \quad (3)$$

Αφαιρώντας κατά μέλη των (2) από την (3) παίρνουμε:

$$\mu_1 (\lambda_1 - \lambda_{k+1}) \vec{X}_1 + \mu_2 (\lambda_2 - \lambda_{k+1}) \vec{X}_2 + \dots + \mu_k (\lambda_k - \lambda_{k+1}) \vec{X}_k = \vec{0}$$

Επειδή όμως το άθροισμα k ιδιοχώρων είναι ελεύθ, τα $\vec{X}_1, \vec{X}_2, \dots, \vec{X}_k$ είναι γραμμικώς ανεξάρτητα και άρα:

$$\left. \begin{aligned} \mu_1 (\lambda_1 - \lambda_{k+1}) &= 0 \\ \mu_2 (\lambda_2 - \lambda_{k+1}) &= 0 \\ \vdots \\ \mu_k (\lambda_k - \lambda_{k+1}) &= 0 \end{aligned} \right\} \xrightarrow{\lambda_{k+1} \neq \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k} \begin{cases} \mu_1 = 0 \\ \mu_2 = 0 \\ \vdots \\ \mu_k = 0 \end{cases}$$

και η (1) γίνεται: $\mu_{k+1} \vec{X}_{k+1} = \vec{0} \xrightarrow{\vec{X}_{k+1} \neq \vec{0}} \mu_{k+1} = 0$

Επομένως, $\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k = \mu_{k+1} = 0$. Δηλαδή, τα $\vec{X}_1, \vec{X}_2, \dots, \vec{X}_k, \vec{X}_{k+1}$ είναι γραμμικώς ανεξάρτητα, οπότε το άθροισμα των ιδιοχώρων $V_{\lambda_1}(A), V_{\lambda_2}(A), \dots, V_{\lambda_k}(A), V_{\lambda_{k+1}}(A)$ είναι ελεύθ.

ΑΣΚΗΣΗ 4

α) $\det B = \det(P^{-1}AP) = (\det P^{-1})(\det A)(\det P) =$
 $= \underbrace{(\det P^{-1})(\det P)}_1 (\det A) = \det A$

β) $B^k = \underbrace{(P^{-1}AP)(P^{-1}AP)(P^{-1}AP) \dots (P^{-1}AP)}_{k\text{-φορές}} =$
 $= P^{-1}A \underbrace{(PP^{-1})}_{I_n} A \underbrace{(PP^{-1})}_{I_n} A \dots \underbrace{(PP^{-1})}_{I_n} AP =$

$$= P^{-1} \underbrace{AAA \dots A}_k\text{-φορές} P = P^{-1} A^k P$$

$$\begin{aligned} \gamma) \chi_B(\lambda) &= \det(B - \lambda I) = \det(P^{-1}AP - \lambda I) = \det(P^{-1}AP - \lambda P^{-1}P) = \\ &= \det[P^{-1}(A - \lambda I)P] = (\det P^{-1}) [\det(A - \lambda I)] (\det P) = \\ &= \underbrace{(\det P^{-1})(\det P)}_1 [\det(A - \lambda I)] = \det(A - \lambda I) = \chi_A(\lambda) \end{aligned}$$

ΑΣΚΗΣΗ 5

(α) ⇒ (β): Έστω ότι ο A είναι διαγωνιοποιήσιμος και $P \in \mathbb{F}^{n \times n}$ είναι ορθογώνιος που διαγωνιοποιεί τον A . Επειδή ο P είναι αντιστρέψιμος, θα έχουμε ότι $\det P \neq 0$, οπότε οι βίτες του P θα είναι μη-μηδενικές. Αν δηλ. $P = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ \vec{p}_1 & \vec{p}_2 & \dots & \vec{p}_n \\ | & | & & | \end{bmatrix}$ τότε $\vec{p}_j \neq \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$, $\forall j=1, 2, \dots, n$

Έστω $D = \begin{bmatrix} d_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & d_n \end{bmatrix}$ (με $d_i \in \mathbb{F}$) ο διαγώνιος ορθογώνιος

που προκύπτει από τη διαγωνιοποίηση του A από τον P . Τότε:

$$P^{-1}AP = D \Rightarrow \underbrace{PP^{-1}}_{I_n} AP = PD \Rightarrow AP = PD \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A \begin{bmatrix} | & | & & | \\ \vec{p}_1 & \vec{p}_2 & \dots & \vec{p}_n \\ | & | & & | \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} d_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & d_n \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} | & | & & | \\ A\vec{p}_1 & A\vec{p}_2 & \dots & A\vec{p}_n \\ | & | & & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ d_1\vec{p}_1 & d_2\vec{p}_2 & \dots & d_n\vec{p}_n \\ | & | & & | \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} A\vec{P}_1 = d_1\vec{P}_1 \\ A\vec{P}_2 = d_2\vec{P}_2 \\ \vdots \\ A\vec{P}_n = d_n\vec{P}_n \end{array} \right\}$$

Άρα τα d_1, d_2, \dots, d_n είναι ιδιοτιμές του A και οι στήλες του P , δηλαδή οι $\vec{P}_1, \vec{P}_2, \dots, \vec{P}_n$ είναι ιδιοδιανύσματα του A .

Επειδή ο P είναι αντιστρέψιμος, τα $\vec{P}_1, \vec{P}_2, \dots, \vec{P}_n$ είναι γραμμικώς ανεξάρτητα διανύσματα του \mathbb{F}^n ,

και αφού έχουν πλήθος $n = \dim \mathbb{F}^n$, θα αποτελούν βάση του \mathbb{F}^n . Δηλαδή, ο \mathbb{F}^n έχει βάση που αποτελείται από ιδιοδιανύσματα του A . Επίσης, επειδή κάθε ιδιοδιάνυσμα του A ανήκει στον \mathbb{F}^n , ο A δεν μπορεί να έχει περισσότερα από n γραμμικώς ανεξάρτητα ιδιοδιανύσματα. Άρα, ο A έχει ακριβώς n γραμμικώς ανεξάρτητα ιδιοδιανύσματα.

(β) \Rightarrow (γ): Έστω $B = \{\vec{X}_1, \vec{X}_2, \dots, \vec{X}_n\}$ βάση του \mathbb{F}^n που αποτελείται από n ιδιοδιανύσματα του A . Άρα:

$$\vec{X}_1, \vec{X}_2, \dots, \vec{X}_n \in (V_{\lambda_1}(A) \oplus V_{\lambda_2}(A) \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}(A))$$

που σημαίνει ότι

$$\langle \vec{X}_1, \vec{X}_2, \dots, \vec{X}_n \rangle \subseteq (V_{\lambda_1}(A) \oplus V_{\lambda_2}(A) \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}(A))$$

Όμως επειδή το $\{\vec{X}_1, \vec{X}_2, \dots, \vec{X}_n\}$ είναι βάση του \mathbb{F}^n , έχουμε:

$$\langle \vec{X}_1, \vec{X}_2, \dots, \vec{X}_n \rangle = \mathbb{F}^n.$$

Άρα: $\mathbb{F}^n \subseteq (V_{\lambda_1}(A) \oplus V_{\lambda_2}(A) \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}(A))$, η οποία σημαίνει προφανώς $(V_{\lambda_1}(A) \oplus V_{\lambda_2}(A) \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}(A)) \subseteq \mathbb{F}^n$

$$\text{Δίνει: } V_{\lambda_1}(A) \oplus V_{\lambda_2}(A) \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}(A) = \mathbb{F}^n$$

(γ) \Rightarrow (α): Έστω $V_{\lambda_1}(A) \oplus V_{\lambda_2}(A) \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}(A) = \mathbb{F}^n$, και έστω

μια βάση B_1 του $V_{\lambda_1}(A)$,

μια βάση B_2 του $V_{\lambda_2}(A)$

\vdots

μια βάση B_k του $V_{\lambda_k}(A)$

Τότε το σύνολο $B = B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_k$ είναι μια βάση του \mathbb{F}^n αποτελούμενη από ιδιοδιανύσματα του A . Έστω

$B = \{\vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_n\}$ όπου $\vec{p}_j = \begin{bmatrix} p_{1j} \\ p_{2j} \\ \vdots \\ p_{nj} \end{bmatrix} \in \mathbb{F}^n$ είναι ιδιοδιάνοιχα του A

που αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή $\mu_j \in \mathbb{F}$.

Ανλαδή: $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k\} = \{\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n\}$ με $k \leq n$

(κάποια μ_j ενδεχομένως να είναι ίσα μεταξύ τους)

Έστω ο πίνακας $P = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ \vec{p}_1 & \vec{p}_2 & \dots & \vec{p}_n \\ | & | & & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \dots & p_{nn} \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned} \text{Τότε: } AP &= A \begin{bmatrix} | & | & & | \\ \vec{p}_1 & \vec{p}_2 & \dots & \vec{p}_n \\ | & | & & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ A\vec{p}_1 & A\vec{p}_2 & \dots & A\vec{p}_n \\ | & | & & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ \mu_1 \vec{p}_1 & \mu_2 \vec{p}_2 & \dots & \mu_n \vec{p}_n \\ | & | & & | \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} P \begin{pmatrix} \mu_1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} & P \begin{pmatrix} 0 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} & \dots & P \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix} \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} \mu_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \mu_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mu_n \end{bmatrix} = PD \end{aligned}$$

όπου $D = \begin{bmatrix} \mu_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \mu_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mu_n \end{bmatrix}$ $n \times n$ διαγώνιος πίνακας

Επειδή τα $\vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_n$, ως διανύσματα βάσης, είναι γραμμικώς ανεξάρτητα ο P είναι αντιστρέψιμος. Άρα η παραπάνω σχέση $AP = PD$

συνεπάγεται ότι $P^{-1}AP = P^{-1}PD \Rightarrow P^{-1}AP = D$

δηλ. ο A είναι όμοιος με το διαγώνιο πίνακα D , και επομένως ο A είναι διαγωνιοποιήσιμος.

ΑΣΚΗΣΗ 6

Έστω $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ οι διαφορετικές ιδιοτιμές του A . Επειδή $V_{\lambda_i}(A) \neq \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \quad \forall i=1,2,\dots,n$, θα έχουμε ότι $\dim V_{\lambda_i}(A) \geq 1$

$$\forall i=1,2,\dots,n. \text{ Επομένως: } \dim(V_{\lambda_1}(A) \oplus V_{\lambda_2}(A) \oplus \dots \oplus V_{\lambda_n}(A)) \geq n \quad (1)$$

Όμως, $V_{\lambda_1}(A) \oplus V_{\lambda_2}(A) \oplus \dots \oplus V_{\lambda_n}(A)$ είναι υπόχωρος του \mathbb{F}^n και $\dim \mathbb{F}^n = n$. Άρα: $\dim(V_{\lambda_1}(A) \oplus V_{\lambda_2}(A) \oplus \dots \oplus V_{\lambda_n}(A)) \leq n \quad (2)$

η οποία, λόγω της (1), δίνει:

$$\dim(V_{\lambda_1}(A) \oplus V_{\lambda_2}(A) \oplus \dots \oplus V_{\lambda_n}(A)) = n, \text{ και επομένως} \quad (3)$$

$V_{\lambda_1}(A) \oplus V_{\lambda_2}(A) \oplus \dots \oplus V_{\lambda_n}(A) = \mathbb{F}^n$, δηλ. ο A διαγωνιοποιείται στο \mathbb{F} .

Επίσης, η (3) συνεπάγεται ότι: $\sum_{i=1}^n \dim V_{\lambda_i}(A) = n \xrightarrow{\substack{\dim V_{\lambda_i}(A) \geq 1 \\ \forall i=1,2,\dots,n}}$

$$\Rightarrow \dim V_{\lambda_i}(A) = 1, \quad \forall i=1,2,\dots,n$$

ΑΣΚΗΣΗ 7

$$\alpha) A - \lambda I = \begin{bmatrix} 3-\lambda & 2 & 4 \\ 2 & -\lambda & 2 \\ 4 & 2 & 3-\lambda \end{bmatrix}$$

$$X_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = (3-\lambda) \begin{vmatrix} -\lambda & 2 \\ 2 & 3-\lambda \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 3-\lambda \end{vmatrix} +$$

$$+ 4 \begin{vmatrix} 2 & -\lambda \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = (3-\lambda) [\lambda(\lambda-3) - 4] - 2 [2(3-\lambda) - 8] +$$

$$+ 4(4 + 4\lambda) = (3-\lambda)(\lambda^2 - 3\lambda - 4) + 20(\lambda + 1) =$$

$$= (3-\lambda)(\lambda+1)(\lambda-4) + 20(\lambda+1) = -(\lambda+1)(\lambda^2 - 7\lambda - 8) =$$

$$= -(\lambda+1)^2(\lambda-8)$$

Άρα χαρακτηριστικός πολυώνυμο του A : $\chi_A(\lambda) = -(\lambda+1)^2(\lambda-8)$

$$\chi_A(\lambda) = 0 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \lambda_1 = -1 \\ \lambda_2 = 8 \end{array} \right\} \text{ ιδιοτιμές του } A$$

β) Για την ιδιοτιμή $\lambda_1 = -1$ έχουμε:

$$A - \lambda_1 I = A + I = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 4 \end{bmatrix} \text{ και } V_{-1}(A) = N(A + I)$$

$$(A + I)\vec{X} = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{Αναλοισή: } \begin{bmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \xrightarrow{(-1/2) \quad (-1)} \\ \xleftarrow{(+)} \\ \xleftarrow{(+)} \end{array} \rightarrow \begin{bmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{Άρα: } 4x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 0 \Leftrightarrow x_1 = -\frac{1}{2}x_2 - x_3$$

$$\text{δηλ. } \vec{X} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-1/2)x_2 - x_3 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} -1/2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x_2, x_3 \in \mathbb{R}$$

$$\text{Επομένως: } \left\{ \text{μία βάση του } V_{-1}(A) \right\} = B_{-1} = \left\{ \begin{bmatrix} -1/2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

Για την ιδιοτιμή $\lambda_2 = 8$ έχουμε:

$$A - \lambda_2 I = A - 8I = \begin{bmatrix} -5 & 2 & 4 \\ 2 & -8 & 2 \\ 4 & 2 & -5 \end{bmatrix} \text{ και } V_8(A) = N(A - 8I)$$

$$(A - 8I)\vec{X} = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} -5 & 2 & 4 \\ 2 & -8 & 2 \\ 4 & 2 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Αναδοίφω: $\begin{bmatrix} -5 & 2 & 4 \\ 2 & -8 & 2 \\ 4 & 2 & -5 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} 2/5 & 4/5 \\ \leftarrow (+) \\ \leftarrow (+) \end{matrix}} \begin{bmatrix} -5 & 2 & 4 \\ 0 & -36/5 & 18/5 \\ 0 & 18/5 & -9/5 \end{bmatrix} \xrightarrow{1/2 (+)} \rightarrow$

$\rightarrow \begin{bmatrix} -5 & 2 & 4 \\ 0 & -36/5 & 18/5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Άρα: $\begin{cases} -\frac{36}{5}x_2 + \frac{18}{5}x_1 = 0 \Rightarrow x_2 = \frac{1}{2}x_1 \\ -5x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 0 \Rightarrow 5x_1 = 2x_2 + 4x_3 \Rightarrow 5x_1 = 5x_3 \Rightarrow x_1 = x_3 \end{cases}$

δηλ. $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_3 \\ \frac{1}{2}x_3 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1/2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x_3 \in \mathbb{R}$

Άρα: $\{\text{μια βάση του } V_8(A)\} = B_8 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

γ) $B = B_{-1} \cup B_8 = \left\{ \begin{bmatrix} -1/2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

Το B έχει 3 διανύσματα, άρα ο A έχει 3 γραμμικώς ανεξάρτητα ιδιοδιανύσματα, και επειδή $n=3$, ο A είναι διαγωνιοποιήσιμος.

δ) Ο πίνακας $P = \begin{bmatrix} -1/2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ (με βτήδες τα διανύσματα του B)

διαγωνιοποιεί τον A και $D = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$ (3x3 διαγώνιος ^{πίνακας} με τις

αντίστοιχες, ως προς τις στήλες του P , ιδιοτιμές του A στην κύρια διαγώνιο)

είναι ο διαγώνιος πίνακας που προκύπτει από την εξίσωση ομοιότητας:

$D = P^{-1}AP$

ΑΣΚΗΣΗ 8

α) Το χαρακτηριστικό πολυώνυμο είναι 3ου βαθμού ως προς λ . Άρα $n=3$.
 Δηλαδή ο A είναι 3×3

β)
$$X_A(\lambda) = 0 \Leftrightarrow -\lambda^3 + 5\lambda - 4 = 0 \Leftrightarrow -\lambda^3 + \lambda + 4\lambda - 4 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -\lambda(\lambda^2 - 1) + 4(\lambda - 1) = 0 \Leftrightarrow (\lambda - 1) [-\lambda(\lambda + 1) + 4] = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -(\lambda - 1)(\lambda^2 + \lambda - 4) = 0 \Leftrightarrow -(\lambda - 1) \left(\lambda + \frac{1 - \sqrt{17}}{2} \right) \left(\lambda + \frac{1 + \sqrt{17}}{2} \right) = 0$$

$$\Rightarrow \left. \begin{cases} \lambda_1 = 1 \\ \lambda_2 = \frac{-1 + \sqrt{17}}{2} \\ \lambda_3 = \frac{-1 - \sqrt{17}}{2} \end{cases} \right\} \text{ δηλ. ο } A \text{ έχει } n=3 \text{ διαφορετικές}$$

πραγματικές ιδιοτιμές και άρα διαγωνιοποιείται
 στο \mathbb{R} (βλ. Αθηνά 6)

γ) Οι A, B είναι όμοιοι. Άρα: $\det B = \det A \Rightarrow \det B = X_A(0) \Rightarrow$
 $\Rightarrow \det B = -4$

ΑΣΚΗΣΗ 9

$$A - \lambda I = \begin{bmatrix} 5 - \lambda & -4 \\ 6 & -6 - \lambda \end{bmatrix}, \quad X_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = (5 - \lambda)(-6 - \lambda) + 24 =$$

$$= \lambda^2 + \lambda - 6$$

$$X_A(\lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 24}}{2} \Leftrightarrow \lambda = \frac{-1 \pm 5}{2} \Rightarrow \left. \begin{cases} \lambda_1 = 2 \\ \lambda_2 = -3 \end{cases} \right\} \text{ ιδιοτιμές του } A$$

δηλ. ο A έχει $n=2$ διαφορετικές πραγματικές ιδιοτιμές και άρα διαγωνιοποιείται στο \mathbb{R} .

Για την ιδιοτιμή $\lambda_1 = 2$ έχουμε:

$$(A - 2I)\vec{x} = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 6 & -8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{Άρα: } 3x_1 - 4x_2 = 0 \Leftrightarrow x_1 = \frac{4}{3}x_2$$

$$\text{Άρα: } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{3}x_2 \\ x_2 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} 4/3 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x_2 \in \mathbb{R}$$

$$\text{Επομένως: } \{ \text{μια βάση του } V_2(A) \} = B_2 = \left\{ \begin{bmatrix} 4/3 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

Για την ιδιοτιμή $\lambda = -3$, έχουμε:

$$(A + 3I)\vec{x} = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 8 & -4 \\ 6 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 8 & -4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{Άρα: } 8x_1 - 4x_2 = 0 \Leftrightarrow x_1 = \frac{1}{2}x_2$$

$$\text{Άρα: } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}x_2 \\ x_2 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x_2 \in \mathbb{R}$$

$$\text{Επομένως: } \{ \text{μια βάση του } V_{-3}(A) \} = B_{-3} = \left\{ \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

Ο πίνακας $P = \begin{bmatrix} 4/3 & 1/2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, με βτήλες τα διανύσματα του $B = B_2 \cup B_{-3}$,

διαγωνιοποιεί τον A . Ο διαγώνιος που προκύπτει είναι ο $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$

δηλ. ο 2×2 διαγώνιος πίνακας με τις αντίστοιχες (ως προς τις βτήλες του P) ιδιοτιμές του A στην κύρια διαγώνιο. Άρα:

$$P^{-1}AP = D \Rightarrow A = PDP^{-1} \Rightarrow A^k = PD^kP^{-1} \quad (k \in \mathbb{N})$$

$$\text{Άρα: } A^{100} = PD^{100}P^{-1}$$

$$\text{όπου } D^{100} = \begin{bmatrix} 2^{100} & 0 \\ 0 & (-3)^{100} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2^{100} & 0 \\ 0 & 3^{100} \end{bmatrix} \quad \text{και } P^{-1} = \frac{1}{\det P} \begin{bmatrix} 1 & -1/2 \\ -1 & 4/3 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P^{-1} = \begin{bmatrix} 6/5 & -3/5 \\ -6/5 & 8/5 \end{bmatrix}$$

$$\text{Άρα: } A^{100} = \begin{bmatrix} 4/3 & 1/2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2^{100} & 0 \\ 0 & 3^{100} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6/5 & -3/5 \\ -6/5 & 8/5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2^{100} - 3^{100}}{5} & \frac{4}{5}(3^{100} - 2^{100}) \\ \frac{6}{5}(2^{100} - 3^{100}) & \frac{8 \cdot 3^{100} - 3 \cdot 2^{100}}{5} \end{bmatrix}$$

ΑΣΚΗΣΗ 10

$$\alpha) \chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) \Rightarrow \chi_A(0) = \det(A)$$

$$\beta) \det B = \chi_B(0) = 172$$

ΑΣΚΗΣΗ 11

Αν ο $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ είναι διαγωνιοποιήσιμος, τότε \exists αντιστρέψιμος πίνακας $P \in \mathbb{F}^{n \times n}$ τέτοιος ώστε: $P^{-1}AP = D$, όπου D διαγώνιος $n \times n$ πίνακας.

$$\text{Έχουμε: } P^{-1}AP = D \Rightarrow A = PDP^{-1} \Rightarrow A^T = (PDP^{-1})^T \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A^T = (P^{-1})^T D^T P^T \Rightarrow A^T = (P^T)^{-1} D^T P^T \xRightarrow{D^T = D} A^T = (P^T)^{-1} D P^T \Rightarrow$$

$$\xRightarrow{D = P^{-1}AP} A^T = (P^T)^{-1} (P^{-1}AP) P^T \Rightarrow A^T = [(P^T)^{-1} P^{-1}] A (P P^T) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A^T = (P P^T)^{-1} A (P P^T) \quad (1)$$

Θέτοντας $M = P P^T$, η (1) γίνεται: $A^T = M^{-1} A M$

και άρα οι A^T, A είναι όμοιοι πίνακες.

ΑΣΚΗΣΗ 12

Λύνεται όπως η Άσκηση 7. Στην περίπτωση που το σύνολο $\mathbb{B} = \{\text{μια βάση του } V_{\lambda_1}(A)\} \cup \{\text{μια βάση του } V_{\lambda_2}(A)\} \cup \dots \cup \{\text{μια βάση του } V_{\lambda_k}(A)\}$ (όπου $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ όλες οι διαφορετικές ιδιοτιμές του A) έχει λιγότερα από n ιδιοδιανύσματα, ο A δεν διαγωνιοποιείται. Αν το \mathbb{B} έχει n ιδιοδιανύσματα ο A διαγωνιοποιείται, οπότε $\exists P$ αντιστρέψιμος τέτοιος ώστε $P^{-1}AP = D$ όπου D διαγώνιος.